



## Patientvejledning

# Kikkertundersøgelse af mavesækken – gastroskopi

## Hvad er en gastroskopi?

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af den øvre mave-tarmkanal, dvs. spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen.

## Hvorfor lave en gastroskopi?

Ved en gastroskopi kan man fx se betændelse, sår på slimhinden samt svulster (godartede eller ondartede). Man kan også tage vævsprøver (biopsier) af de forandringer man finder eller for at teste for mavesårsbakterier.

## Hvordan forbereder jeg mig?

Du må ikke spise 6 timer før og ikke drikke 2 timer før undersøgelsen. Mindre mængder vand kan indtages indtil 2 timer før undersøgelsen. Tager du fast medicin, må du tage denne indtil 2 timer før undersøgelsen.

## Hvordan udføres undersøgelsen?

Undersøgelsen foretages med et moderne, bøjeligt video-gastroskop, så man via en TV-skærm er i stand til at se og undersøge spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen.

Gastroskopet nedføres samtidig med at der foretages en synkebevægelse. Under undersøgelsen pustes der luft i mavesækken, hvilket er forbundet med et vist ubehag i form af kvalme og trykken i maven. Undervejs kan der tages vævsprøver fra mavesækkens slimhinde fx med henblik på påvisning af mavesårsbakterien *Helicobacter Pylori* – du kan ikke mærke at prøverne tages.

Afsæt 20-25 minutter til dit besøg i klinikken. Selve undersøgelsen varer ca. 3-5 minutter.

## Hvad sker der bagefter?

Hvis der er taget en prøve for mavesårsbakterier, får du svar på prøven pr mail i løbet af 1-2 uger. Hvis du har fået svælgbedøvelse må du først spise og drikke 2 timer efter undersøgelsen pga risiko for at fejlsynke.

## Hvilke risici er der forbundet med proceduren?

Hypigt opstår forbigående let irritation i svælg og ømheden i halsen. Lidt blod i opspyt kan forekomme, og yderst sjældent kan der gå hul på mavesækken eller tarmen. Ved mistanke om komplikationer (fx stærke smerter i maven, blødning og/eller feber) skal klinikken (tlf 4816 5115) eller skadestuen kontaktes.

### Hovedbudskaber

- Du skal faste før undersøgelsen
- Undersøgelsen er ubehagelig men varer kun få minutter

