

PATIENTVEJLEDNING

OPERATION I ENDETARMSÅBNINGEN (operation for marisker)

Man opererer i endetarmsåbningen, hvis man skal fjerne større hæmoroider, løs hud efter hæmoroider (marisker), bylder eller behandle en kronisk revne (fissur) i endetarmsåbningen, som ikke heler på medicinsk behandling.

FØR OPERATIONEN

Der er ingen forberedelser før operationen.

UNDER OPERATIONEN

Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via et stik i selve hæmoroiderne eller i omgivelserne til endetarmsåbningen.

EFTER OPERATIONEN

Du vil som regel selv kunne køre hjem efter operationen.

Det er vigtigt, at du tager den med ro de første dage efter operationen.

Efter operationen passes sårene med en håndbruser (lunkent vand) to gange daglig og efter toiletbesøg indtil operationsområdet er smertefrit. Kolde omslag i 20 minutter af gangen kan anvendes for at standse eventuel blødning og reducere smerterne.

De første 2-3 dage efter operationen er oftest smertefulde - mod smerter kan tages paracetamol (fx Pamol, Pinex, Panodil) og ibuprofen (fx Ibumetin, Brufen).

Det er vigtigt at blødgøre afføringen for at lette passagen igennem operationssåret, hvorfor du med fordel kan anvende svesker, laktulose mixtur eller magnesia.

Der skal ikke fjernes sting.

EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Blødning er sjældent og infektion er yderst sjældent. Ved mistanke om komplikationer bør du kontakte klinikken, skadestuen eller egen læge.