

PATIENTVEJLEDNING

OPERATION FOR KORT FORHUDSBÅND (Frenulum breve)

Frenulum breve kan være en ubehagelig tilstand, som vanskeliggør seksuel aktivitet pga smerter og sår dannelse. Ved en lille operation overskæres forhudsbandet på tværs og syes sammen på langs, hvorved forhudsbandet forlænges og generne ophører.

FØR OPERATIONEN

Hvis du får medicin herunder naturmedicin, er det vigtigt at oplyse lægen om dette. Specielt er der forhold omkring blodfortyndende behandling (Marevan, Hjertemagnyl, Plavix og lignende) som det er yderst vigtigt at oplyse lægen om, så pausering evt. kan aftales.

UNDER OPERATIONEN

Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via stik direkte i forhudsbandet.

EFTER OPERATIONEN

Det er vigtigt at forhuden trækkes frem over penishovedet (glans), idet der ellers kan opstå voldsom hævelse af forhuden. De første 2-3 dage efter operationen kan der forekomme lette smerter, som kan behandles med paracetamol (Pamol, Pinex, Panodil) og ibuprofen (Ibumetin, Brufen). Normalt kan almindelige fysiske aktiviteter genoptages umiddelbart.

EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Blødning er sjælden og infektion er yderst sjælden. Let misfarvning af penis omkring såret forekommer. Ved mistanke om komplikationer bør du kontakte klinikken eller skadestuen. Der er ingen garanti for, at det kosmetiske resultat svarer til forventningerne.